

江 西 产 新 变 种 植 物

俞 志 雄

NEW VARIETIES FROM JIANGXI

Yu Zhi-xiong

井冈山紫果槭 新变种 照片 1

Acer cordatum Pax var. *jinggangshanense* Z. X. Yu, var.
nov.

A typo differt foliis quandoque lobis unilateralibus vel trilobatis, margine praeter basin integrum serrulatis, subtus juventute brunneo-papillato-puberulis et secus costam nervosque laterales fulvo-sericeo-pubescentibus, etiam in axillis nervorum fulvo-sericeobarbatis, aetute (in axillis nervorum fulvo-sericeobarbatis, ceterum) glabrescentibus vel (vix) glabris, nervis infimis saepe usque ad vel ultra medium laminarum procurentibus, petiolis primo fulvo-sericeo-pubescentibus et brunneo-papillato-puberulis, demum glabrescentibus vel vix glabris.

江西 (Jiangxi): 井冈山 (Jinggangshan) 珠砂冲, 林内, 海拔 500 米, 1974 年 5 月, 采集人未详 (sine coll.) 740126; 同地 (ibid), 红军游击队洞口, 岩畔海拔 880 米, 1979 年 5 月 19 日, 俞志雄和张秋根 (Z. X. Yu et Q. G. Zhang) 790014; 龙潭至将军洞途中, 山地杂木林中,

本文作者工作单位: 江西, 江西农业大学 (Jiangxi Agricultural University, Jiangxi)

本人在野外工作中, 曾分别得到井冈山自然保护区、铜鼓县林科所以及国营龙门林场的大力协助, 特此致谢。

文中 JXAU=Herb. Jiangxi Agric. Univ. (江西农业大学林学系植物标本室); NEFI=Herb. North-East. Forest. Inst. (东北林学院植物标本室)。

海拔 830 米, 1983 年 9 月 17 日, 俞志雄 (Z. X. Yu) 8342; 龙潭, 点将台, 海拔 778 米, 1983 年 9 月 17 日, 俞志雄 (Z. X. Yu) 8346; 同地, 山地林中, 1983 年 9 月 22 日, 俞志雄 (Z. X. Yu) 8361 (Typus! JXAU, Isotypus NEFl), 8362。

本变种与原变种不同在于叶有时具有单侧裂片或 3 浅裂, 边缘除基部全缘外有细锯齿, 下面幼时被棕色乳头状微柔毛以及沿中脉和侧脉均被黄棕色绢状短柔毛, 而且脉腋有黄棕色绢状髯毛, 老时在脉腋有黄棕色绢状髯毛, 余处变近无毛或无毛, 最下一对侧脉通常伸达叶片中部或中部以上; 叶柄初时被黄棕色绢状短柔毛和棕色乳头状微柔毛, 最后变近无毛或无毛。

铜鼓槭 新变种 照片 2

Acer fabri Hance var. *tongguense* Z. X. Yu, var. nov.

A typo recedit foliis basi subrotundatis vel leviter subcordatis (non cuneatis vel obtusis), samaris subhorizontaliter divaricatis.

江西 (Jiangxi): 铜鼓 (Tonggu), 龙门, 1978 年 9 月 10 日, 喻国兴等 (G. S. Yu et al.) 龙 19; 同地 (ibid), 山谷溪边, 杂木林缘, 海拔 420 米, 1983 年 8 月 31 日, 俞志雄 (Z. X. Yu) 8335 (Typus JXAU; Isotypus! NEFl)。

本变种与原变种的区别在于叶基部近圆形或微心形 (非为楔形或钝); 翅果张开近于水平。

武夷山空心泡 新变种

Rubus rosaefolius Smith var. *wuyishanensis* Z. X. Yu, var. nov.

A varietate prima recedit omnino planta inermi, floribus pleiopetalis, petalis usque ad 60 instructis.

Jiangxi: Yanshan, Wuyishan, alt. 930m, prope viam, 10 V. 1983, Q. G. Zhang, Z. H. Lou et al. 0079 (Typus, in Herb. Jiangxi Agric. Univ. conserv.); ibid., alt. 852m, prope viam, 8 V. 1984, Z. X. Yu 8417, 8418, 8419, 8420; Nanchang, Jiangxi Agric. Univ., alt. 57m, cult., 15 V. 1984, Z. X. Yu 8421 8422.


江西: 铅山, 武夷山, 海拔 930 米, 路旁, 1983 年 5 月 10 日, 张秋根、楼渐辉等 0079 (模式, 存江西农业大学林学系植物标本室); 同地, 海拔

352 米，路旁，1984年5月8日，俞志雄，8417，8418，8419，8420；南昌，江西农业大学，海拔 57 米，从武夷山挖取植株带回校园盆栽，1984年5月15日，俞志雄8421，8422。

本变种与原变种的区别在于植株无刺，花重瓣，花瓣多达60枚。


本植物无刺，花重瓣，花瓣洁白，数目殊多，颇美丽，是一种具有甚高观赏价值的野生木本花卉，宜选作栽培供观赏。

— . . . —



照片 1 井冈山紫果槭 *Acer cordatum* Pax

var. *jinggangshanense* Z. X. Yu, var. nov.



照片 2 细齿槭 *Acer fabri* Hance

var. *tongguense* Z. X. Y., var. nov.